

Розпізнання анафілаксії й реагування

У разі підозри або активного прояву алергічної реакції

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ
БУДЬ-ЯКОГО З ЦИХ

ТЯЖКИХ СИМПТОМІВ

	ЛЕГЕНІ	Задишка, хрипіння, постійний кашель
	СЕРЦЕ	Бліда або синюшна шкіра, втрата свідомості, слабкий пульс, запаморочення
	ГОРЛО	Відчуття стиснення в горлі або хриплий голос, труднощі з диханням або ковтанням
	РОТ	Значний набряк язика або губ
	ШКІРА	Численний сип на тілі, широко розповсюджене почервоніння
	ШКТ	Часта блювота, сильна діарея
	ІНШЕ	Відчуття, що станеться щось погане, тривожність, сплутаність свідомості

АБО БІЛЬШЕ
ОДНОГО

ЛЕГКОГО СИМПТОМУ

	НІС	Свербіж у носі, виділення з носа, чихання
	РОТ	Свербіж рота
	ШКІРА	Невеликий сип, легкий свербіж
	ШКТ	Легка нудота або дискомфорт

1

НЕГАЙНО ВВЕДІТЬ ЕПІНЕФРИН

2

 **Зателефонуйте
911**

Попросіть швидку
з епінефрином.

**Зверніться до інших
препаратів**
(після епінефрину)

- » Антигістамінні.
- » Інгалятор (бронхолітик) у разі астми.

Позиція

- » Покладіть людину на рівну поверхню й підніміть ноги.
- » Якщо дихання ускладнене або людина блює, посадіть її або покладіть на бік.

Наступні кроки

- » Якщо симптоми не зникають або повертаються, через 5 або більше хвилин після останньої дози епінефрину можна дати ще одну дозу.
- » Рушайте до відділення невідкладної допомоги й лишайтеся там щонайменше 4 години, тому що симптоми можуть повернутися. Негайно повідомте осіб для зв'язку в разі невідкладної ситуації.

Не розраховуйте на антигістамінні.

У разі сумнівів дайте епінефрин і зателефонуйте 911.

